LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

DIHIDROESTREX INYECTABLE

Composición

Dihidroestreptomicina (sulfato)????????...???50 g
Excipiente c.s.p?????..?????????????.100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Perros, Equinos, Aves.
Bovinos: Leptopirosis, Colibacicolis, Neumoenteritis, Pasteurelosis, Salmonelosis.
Porcinos: Leptospirosis, neumonía, Salmonelosis, Septicemia.
Ovinos y Caprinos: Aborto paratífico, Pasteurelosis.
Equinos: Aborto paratífico, Pasteurelosis, Septicemia.
Perros: Leptospirosis.
Aves: Coriza Infeccioso, Cólera aviar.

Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular profunda.
Bovinos y Porcinos: 1 mL/10 Kg p.v. (50 mg de Dihidroestreptomicina/ Kg p.v.), en dosis única.
Equinos, Ovinos y Caprinos: 0,5 mL/ 10 kg p.v. /día, durante 3 días.
Perros: 0,1 mL/ kg p.v. (50 mg de Dihidroestreptomicina/ kg p.v.)/día, durante 3 días.
Administrar con precaución en animales con historial de alergias. Vigilar la función renal durante el tratamiento, sobre todo en animales jóvenes.
Evitar tratamientos prolongados, sobre todo en carnívoros.
Aves: Pollos, gallinas, pavos; 50 a 100 mg/kg p.v. del producto diluido 1:10 ó 1:20 con agua para inyección, en dosis única.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

250 mL

Tiempo de retiro:

CARNE: 30 días.
LECHE: 2 días.

Contraindicaciones:

Animales con historial conocido de hipersensibilidad a aminoglicosidos. Animales con insuficiencia renal, hepatopatias, cardiopatías o con lesiones cocleovestibulares. Animales con edad inferior a un mes. Equinos destinados al consumo humano. Hembras gestantes. No usar en ponedoras para huevos de consumo humano.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N071432