



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.  
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A  
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca  
J-07524745-0

**Asistente Gerencia Ventas**  
Amarilis Espinoza  
**Contacto:** 0243-5515432 5516403  
ventas@reveex.com  
www.reveex.com

## DIMINAZENE-A

### Composición

4,4?-diazooamino dibenzamidina diaceturato????..... 7 g  
Antipirina???..????????????????????????????25 g  
Excipientes?????????????..????..?????.. 100 ml

### Descripción e indicaciones

Bovinos y equinos.

Tratamiento de la Tripanosomiasis bovina (huequera, caho, hueco, derrengadera) causada por Trypanosoma vivax y T. congolense.

Tratamiento de la Tripanosomiasis equina causada por T. vivax.

Tratamiento de Babesiosis (Piroplasmosis) bovina causada principalmente por B. bigemina (fiebre de la garrapata) y B. argentina.

Tratamiento de Babesiosis (Piroplasmosis) equina causada por B. caballi.

Tratamiento de infecciones mixtas por tripanosomas y babesias.

### Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular profunda (en los músculos de la tabla del cuello, pierna trasera o cadera).

Bovinos y equinos: 1 ml por 20 Kg p.v. (3,5 mg / kg p.v.).

Si es necesario, repetir la inyección cada 24 horas.

En infestaciones por Trypanosoma brunei administrar el doble de dosis: 1 ml / 10 kg p.v.

### Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

### Efecto terapéutico:

Hemoparasitocida

### Especies:



### Presentaciones:

100 mL



**Tiempo de retiro:**

CARNE: 21 días.

LECHE: No usar.

**Contraindicaciones:**

N/A

**Nro. Registro S.A.S.A.:** N/A

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PN33N073251