



LABORATORIOS TOPP, C.A
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y
27 Turmero Estado Aragua.

J-30104680-3

Gerente General

Giuseppe Manilia

Contacto: 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263

giuseppe.manilia@gmail.com

www.laboratoriostopp.com

Tribabecid

Composición

Diaminazeno diaceturato 7.00 g

Antipirina 35.00 g

Excipiente, C.S.P. 100.00 ml

Descripción e indicaciones

La antipirina esta provista de acción antipirética y analgésica. La acción analgésica es mayor de aquella de los salicilatos y es acompañada de por cierta acción sedante.

El Diaminazeno es tripanocida y babesicida. Como tripanocida actúa contra Trypanosoma vivax, T. congolense, T. brucei y T. evansi. Es menos efectivo contra T. brucei, contra el cual debe ser usado en dosis mayores que contra los demás tripanosomas. Como babesicida, actúa contra Babesia bigemina, B. bovis, B. divergens, B. caballi, y B. equi. En general las especies grandes de Babesia (B. bigemina y B. caballi) responden fácilmente al tratamiento que las pequeñas (B. bovis y B. equi).

El efecto del Diaminazeno se manifiesta rápidamente: contra Babesia spp, suele producirse una disminución de los signos de infección dentro de 24 horas. Este se usa primeramente como droga curativa. Su efecto profiláctico tiene una duración de aproximadamente 22 días. No se produce fácilmente resistencia en los parásitos, por lo que el Diaminazeno es considerada como la droga de elección en caso de resistencia del T. vivax a otros compuestos tripanocidas.

Tripanosomiasis bovina y equina (huequera, derrengadera, cachera, renguera, mal de cadera, cacho hueco, secadera); babesiosis o piroplasmosis bovina y equina (fiebre de garrapatas, ranilla roja, ranilla de sangre, tristeza del ganado); infecciones mixtas por tripanosomas y babesias.

Vía de Administración y dosificación:

Vía IM profunda. Dosis: 1 ml/20 kg PV (5 ml/100 kg PV). En caso de infestaciones por T. Brucei, administrar 1 ml/10 kg PV (10 ml/100 kg). Si es



necesario, repartir la dosis en varios puntos. No inyectar más de 10 ml en cada lugar.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antiparasitario Endectocida, Ectoparasiticida

Especies:  

Presentaciones:

Frasco de vidrio ámbar de 100 y 250 ml.

Tiempo de retiro:

Carne: 20 días; Leche: 9 días

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F. 7.179

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite