LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

ECTO-VEEX

Composición

Amitraz ????????????.12,5 g
Cipermetrina ???????.??. 2,5 g
Excipientes c.s.p??????? 100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos, ovinos y porcinos.
ECTO-VEEX es un garrapaticida indicado para Bovinos y ovinos: Tratamiento y control de infestaciones por garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennense), moscas (Haematobia irritans, Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis, Hydrotaea irritans), ácaros de la sarna (Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis, Chorioptes bovis) y piojos (Linognathus sp., Haematopinus sp., Damalinia bovis).
Porcinos: Tratamiento y control de infestaciones por ácaros de la sarna (Sarcoptes scabiei var. suis), piojos (Haematopinus suis) y moscas.

Vía de Administración y dosificación:

Baño por aspersión o baño por inmersión: para Bovinos: diluir 1 litro de ECTO-VEEX en 700 l de agua. En cuanto a Ovinos y porcinos: diluir 1 litro de ECTO-VEEX en 350 l de agua. Hacer una predilución depositando la dosis a aplicar en un litro de agua y luego agregarla al resto del agua, agregar la mezcla a la máquina aspersora y rociar los animales contra el pelo, utilizando 5 litros de solución por bovino adulto, asegurándose que todo el pelo quede mojado.

La frecuencia de baños depende del tipo de garrapata. Para Boophilus microplus se recomienda baños cada 21 días y para Amblyomma cajennense cada 7 días.

Forma farmacéutica:

Solución Tópica (Baño)

Efecto terapéutico:

Ectoparasiticida

Especies:

Presentaciones:

1 L y 286 mL

Tiempo de retiro:

Carne 7 días.
Leche 24 horas.

Contraindicaciones:

No aplicar en Equinos.

Nro. Registro S.A.S.A.: P.F 4.828

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite