LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
**Asistente Gerencia Ventas**
Amarilis Espinoza
**Contacto:** 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

# ENROFLOXACINA 5% REVEEX

## Composición

Enrofloxacina ??.????????????5 g
Excipientes c.s.p??????????..100 mL

## Descripción e indicaciones

Tratamiento y control de infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la Enrofloxacina, en particular:
Porcinos: Diarrea colibacilar (colidisenteria), Colienterotoxemia (enfermedad de los edemas), salmonelosis, Síndrome M.M.A. (Mastitis-Metritis-Agalaxia), Pleuroneumonía y complicaciones bacterianas de enfermedades virales.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: Infecciones respiratorias, Pasteurelosis, Colibaciolosis, Colisepticemia, Salmonelosis e infecciones bacterianas secundarias a enfermedades virales.

## Vía de Administración y dosificación:

Porcinos: Administrar por vía intramuscular en la musculatura del cuello, 0.5 mL/10 Kg p.v/día. (2.5 mg de Enrofloxacina/Kg p.v/día), durante 3 días. En el caso de M.M.A de las cerdas tratar durante 1 a 2 días. No administrar más de 2.5 mL en el mismo punto de inyección.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: Administrar por vía subcutánea, 0.5 mL/ 10 Kg de p.v/día. (2.5 mg de Enrofloxacina/Kg p.v. / días). Durante 5 días. No administrar más d 10 ml en el mismo punto de inyección.
En las tres especies, se recomienda doblar la dosis en infecciones respiratorias severas y salmonelosis.

## Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

## Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

## Especies:

## Presentaciones:

100 mL

## Tiempo de retiro:

Carne: Cerdos: 10 días.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: 12 días.
Leche: No usar.

## Contraindicaciones:

Animales conocidas con resistencia, a las quinolonas, animales recién nacidos, animales con trastornos de crecimiento cartilaginoso.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** N/A

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PN33N072725