LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

GENTAVEEX 12%

Composición

Gentamicina (sulfato)??????????12 g
Excipientes c.s.p??????????..100 ml

Descripción e indicaciones

Porcinos: Colibacilosis, Salmonelosis, Septicemia hemorrágica.
Bovinos: Colibacilosis, Salmonelosis, Mastitis, Pasteurelosis, Bronconeumonía, Infecciones genitourinarias.
Equinos: Colibacilosis, Salmonelosis, Bronconeumonía, Metritis.
Perros: Infecciones urinarias, Neumonía, Rinitis, Infecciones cutáneas, Artritis infecciosa.

Vía de Administración y dosificación:

Intramuscular.
Porcinos, Bovinos y Equinos: 1 ml/40 kg p.v (3 mg de Gentamicina/kg p.v), cada 12 horas durante 3 días.
Perros: 0,2 ml/8 kg p.v. (3 mg de Gentamicina/kg p.v), cada 12 horas, durante 4 a 5 días.
Administración de dosis pequeñas, así como por vía intravenosa lenta en grandes animales, puede efectuarse aplicando el producto diluido al 5% en suero glucósado estéril.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

100 mL

Tiempo de retiro:

Carne:
Porcinos: 40 días.
Bovinos y Equinos: 60 días.
Leche: 3 días.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la gentamicina.
No administrar en hembras gestantes.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F 12.151 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** En tramite