LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

ISOPAN

Composición

Cloruro de Isometamidio???????????. 10 mg
Oxitetraciclina clorhidrato?????????? 280 mg
Antipirina sódico??????????????. 150 mg
Diluente c.s.p??????????????????1 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos:
Tratamiento curativo de la Tripanosomiasis bovina causada por Tripanosoma vivax y de la Anaplasmosis bovina causada por Anaplasma marginale.
Tratamiento preventivo de la Tripanosomiasis bovina causada por Tripanosoma vivax.

Vía de Administración y dosificación:

Adicionar el Agua para inyección al frasco que contiene el Polvo para inyección y agitar hasta disolución total.
Administrar por vía intramuscular profunda, preferiblemente en el centro de la tabla del cuello o en la cadera, en dosis única.
Se recomienda repartir la dosis total en 2 puntos de inyección distintos y dar un buen masaje en el sitio de inyección después de la aplicación.
Bovinos:
Tratamiento curativo de la Tripanosomiasis y Anaplasmosis Bovina: 1 mL de la suspensión o solución reconstituida / 20 kg p.v. (0,5 mg de Cloruro de Isometamidio y 14 mg de Oxitetraciclina / kg p.v.), en dosis única.
Este tratamiento a la dosis indicada, permite curar la Tripanosomiasis y Anaplasmosis Bovina, y al mismo tiempo protege al ganado de nuevas infestaciones por Tripanosoma sp durante un periodo de 2 a 6 meses, dependiendo del grado de infestación de la zona y de la sensibilidad de las cepas infectantes.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Hemoparasiticida

Especies:

Presentaciones:

500 mL

Tiempo de retiro:

Carne: 30 días.
Leche: No usar.

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N071350