



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

ENROFLOXACINA 20% REVEEX

Composición

Enrofloxacin..... 20 g
Excipientes c.s.p..... 100 mL

Descripción e indicaciones

Aves (pollos de engorde, Reproductoras, Pollitas de reemplazo).
Pollos de engorde, Reproductoras, Pollitas de reemplazo: Tratamiento curativo de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Enrofloxacin, que afecten al tracto respiratorio, intestinal y urogenital, así como de infecciones bacterianas asociadas a procesos víricos; en particular Enfermedad Respiratoria Crónica (C.R.D) pura o complicada con E. coli, Enteritis colibacilar, Colibacilosis respiratoria, Colibacilosis genital, Colisepticemia, Salmonelosis, Pasteurelisis, Coriza infecciosa, Estafilococia, Estreptococia.

Vía de Administración y dosificación:

Administrar por vía oral, en el agua de bebida.
La dosis terapéutica de Enrofloxacin es de 10 a 20 mg/kg p.v. /día, lo que correspondería a una dosis de 0,05 a 0,1 ml/kg p.v. /día.
Pollos de engorde de menos de 3 semanas, Reproductoras pesadas de menos de 3 semanas, Reproductoras ligeras de menos de 5 semanas, pollitas de reemplazo de menos de 5 semanas: 0,25 a 0,50 ml/litros (0,25 a 0,50 litros/1000 litros) de agua de bebida/día, durante 3 a 5 días.
Pollos de engorde de más de 3 semanas, Reproductoras pesadas de más de 3 semanas, reproductoras ligeras de más de 5 semanas, Pollitas de reemplazo de más de 5 semanas: 0,50 a 1 mL / litro (0,50 a 1 litro / 1.000 litros) de agua bebida/día, durante 5 días como mínimo.
En caso de salmonelosis, infecciones mixtas o procesos crónicos, tratar durante 5 días como mínimo.
En casos graves, administrar la dosis más alta (20 mg/kg p.v.) y mantener el tratamiento durante los días indicados.



Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:**Presentaciones:**

1 Litro

Tiempo de retiro:

Carne: 5 días.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con insuficiencia renal o hepática ni a aquellos que hayan demostrado sensibilidad a las quinolonas.

No debe ser administrado a animales recién nacidos.

No administrar en aquellos casos en que haya una infección estreptocócica previa, ya que puede existir una sensibilidad marginal de los estreptococos a la enrofloxacin.

No se administre en aves ponedoras de huevos para consumo humano.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N072164