LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

BRONCOVEEX

Composición

Bromhexina (clorhidrato)???????.1 g
Excipientes c.s.p????????????100 ml

Descripción e indicaciones

Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos:
Esta indicado por su acción mucolítico secretolitico y expectorante como un eficaz coadyuvante en la profilaxis y tratamiento de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas que cursen con moco viscoso bronquial en aves, porcinos, bovinos y equinos. Es útil en reacciones postvacunales de las aves.

Vía de Administración y dosificación:

Administrar por vía oral.
Dosis Farmacológica:
? Aves: 0,02 mg por kg de peso
? Cerdos, Bovinos y Equinos: 20 ml / 40 kg (equivalente a una dosis de 0,5 mg de bromhexina por kg)
Oral disuelto en el agua de bebida por 5 a 7 días.
? Para aves de corral 100 ml en 1000 L de agua.
? Cerdos?????.. 0.2 a 0,5 ml / animal
? Lechones????. 0,1 a 0,25 ml/ animal
? Becerros ????. 0,3 a 0,7 ml / animal
? Bovinos y Equinos 1 a 1,5 ml / animal

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Broncoldilatador

Especies:

Presentaciones:

1 Litro

Tiempo de retiro:

Carne de Aves y porcinos: cero días
Bovinos: 2 días antes.
Leche: No usar.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con:
-Edema pulmonar.
-En periodos de lactancia y gestación.
- Equinos: No administrar a animales sospechosos de trastornos digestivos.

Nro. Registro S.A.S.A.: 6467 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** En tramite