



**Representante:** AGROSUPLIDORES FL. C.A  
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC  
MALIA,LOCAL 07  
J-31353351-3

**GERENTE GENERAL**  
ALEJANDRO LINARES

**Contacto:** 0241-8716214  
alejandro.linares@agrosuplidores.com.ve  
www.agrosuplidores.com.ve



## MEGLUXIN

### Composición

Cada ml contiene:

Flunixinio (meglomina) 50 mg

### Descripción e indicaciones

**Bovinos:** Indicado para el control de la inflamación aguda y control de la pirexia asociada con la enfermedad respiratoria bovina.

**Equinos:** Indicado para el alivio de la inflamación y el dolor asociados con los trastornos músculo-esqueléticos en estados agudos y crónicos, y para el alivio del dolor visceral asociado con el cólico.

**Porcinos:** Indicado como ayuda en el tratamiento del síndrome mastitis-metritis-agalaxia de las cerdas (MMA)

### Vía de Administración y dosificación:

Intravenoso Bovinos y Equinos

Intramuscular en Cerdos

**Bovinos:** Control de la inflamación aguda y control de la pirexia asociada con la enfermedad respiratoria bovina: 2,2 mg de flunixinio (meglomina) /kg p.v cada 24 horas durante un máximo de 3 días (equivalente a 0,44 ml de MEGLUXIN/ 10kg /p.v)

**Equinos:** Alivio de la inflamación y el dolor asociados con los trastornos músculos-esqueléticos en estados agudos y crónicos: 1,1 mg de flunixinio (meglomina)/kg p.v. cada 24 horas durante un máximo de 5 días (equivalente a 0,22 ml de MEGLUXIN/10 kg/p.v)

Alivio de dolor visceral asociado con el cólico: 1,1 mg de flunixinio (meglomina)/kg p.v (equivalente a 0,22 ml de MEGLUXIN/10 kg/p.v) El tratamiento se puede repetir 1 o 2 veces si persisten los síntomas.

**Porcinos:** Tratamiento de síndrome metritis-mastitis-agalaxia en cerdas: 2,2 mg de flunixinio (meglomina)/kg p.v (equivalente a 0,44 ml de MEGLUXIN/10 kg/p.v) Puede administrarse una o dos inyecciones separadas por 12 horas

El número de tratamiento (uno o dos) dependerá de la respuesta clínica



obtenida

**Forma farmacéutica:**

Solución Inyectable

**Efecto terapéutico:**

Analgésico, Antiinflamatorio no esteroideo AINES

**Especies:**   

**Presentaciones:**

Frasco de 50 ml

Frasco de 100ml

**Tiempo de retiro:**

Bovinos: carne 1 día

          leche no precisa

Cerdos: 21 días

No administrar a equinos cuya carne esté destinada al consumo humano

**Contraindicaciones:**

No usar en caso de existir signos de discrasias sanguíneas.

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I 12.395

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PI33N072166