

CARVAL VENEZUELA, S.A.  
CALLE 10-A CON CALLE 5, EDIFICIO CENTRO  
EMPRESARIAL ORINOCO, PISO 3 OFICINA 15,  
URBANIZACIÓN LA URBINA, MUNICIPIO SUCRE.  
J-30785220-8

**Gerente Comercial y Asesor Técnico**

Freddy A. Martínez Mendez

**Contacto:** 0212-4193741-4193762 / 0241 6110097

freddy.martinez@carval.com.ve

## CIPROFLOXACINA CARVAL 20%

### Composición

Cada 100 g de CIPROFLOXACINA CARVAL 20% contienen:

PRINCIPIO ACTIVO

Ciprofloxacina Clorhidrato 20 g

Excipientes c.s.p 100 g

### Descripción e indicaciones

En pollos de engorde, pollas de reemplazo y pavos para el control y tratamiento de infecciones ocasionadas por: *Escherichia coli*, *Haemophilus sp*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Mycoplasma sp*.

### Vía de Administración y dosificación:

Vía Oral.

La dosis media recomendada es de 10 mg de Ciprofloxacina por kg de peso vivo por 3 a 5 días, lo que equivale a 50 mg de CIPROFLOXACINA CARVAL 20% por kg de peso vivo.

Suministrar por vía oral CIPROFLOXACINA CARVAL 20%, en el agua de bebida por 5 días consecutivos.

Dosis práctica 1 g de CIPROFLOXACINA CARVAL 20%, por cada 4 L de agua.

### Forma farmacéutica:

Polvo Oral

### Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

### Especies:



### Presentaciones:

Sobre Foil de 500 g y 1 kg



**Tiempo de retiro:**

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. no administrar a ponedoras cuyos huevos son destinados al consumo humano.

**Contraindicaciones:**

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico Veterinario.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I.: 10.802

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** En Trámite