

CARVAL VENEZUELA, S.A.  
CALLE 10-A CON CALLE 5, EDIFICIO CENTRO  
EMPRESARIAL ORINOCO, PISO 3 OFICINA 15,  
URBANIZACIÓN LA URBINA, MUNICIPIO SUCRE.  
J-30785220-8

**Gerente Comercial y Asesor Técnico**

Freddy A. Martínez Mendez

**Contacto:** 0212-4193741-4193762 / 0241 6110097

freddy.martinez@carval.com.ve

## LINCARVAL PREMIX

### Composición

Cada 100 gramos de LINCARVAL ®PREMIX contienen:

PRINCIPIO ACTIVO

Lincomicina 4.4 g

Excipientes c.s.p 100 g

### Descripción e indicaciones

Para el tratamiento y control de Neumonía Micoplásmica (*Mycoplasma hyopneumoniae*), Disenteria Porcina (*Brachyspira hyodysenteriae*), Ileitis (*Lawsonia Intracellularis*).

### Vía de Administración y dosificación:

Administración Oral, dosificar con el alimento.

Para el tratamiento de: Neumonía ezootica dosis de 2 kg a 5 kg de LINCARVAL PREMIX / Ton de alimento (88 a 220 ppm); Disenteria Porcina dosis de 2,5 kg de LINCARVAL PREMIX / Ton de alimento (110 ppm).

### Forma farmacéutica:

Polvo Oral

### Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies: 

### Presentaciones:

Sacos multipliegos de 10 kg, 12.5 kg, y 25 kg.

### Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 6 días después de finalizado el tratamiento.



**Contraindicaciones:**

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico Veterinario.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I.: 11.810

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** TRÁMITE