



**Representante:** AGROSUPLIDORES FL. C.A  
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC  
MALIA,LOCAL 07  
J-31353351-3

**GERENTE GENERAL**  
ALEJANDRO LINARES

**Contacto:** 0241-8716214  
alejandro.linares@agrosuplidores.com.ve  
www.agrosuplidores.com.ve



## OXIPRA-20 L.A.

### Composición

Cada ml contiene:  
Oxitetraciclina (clohidrato) 200mg  
Excipientes c.s.p

### Descripción e indicaciones

Debido a sus características farmacocinéticas particulares, una sola administración intramuscular es suficiente para mantener los niveles terapéuticos del antibiótico en sangre durante 3 a 5 días. Los niveles máximos en sangre se obtienen rápidamente, lo que le hace apropiado para el tratamiento de las infecciones agudas.

Aves: Pasteurelosis, CRD y Coriza infeccioso

Cerdos: Septicemia Hemorrágica, Diarreas, Enteritis bacterianas y Síndrome MMA

Ovinos y Caprinos: Clamidiosis, Pasteurelosis, Diarreas y Enteritis bacterianas.

Bovinos: Neumoenteritis, Mastitis y Metritis

### Vía de Administración y dosificación:

Intramuscular Profunda

En aves, vía subcutánea, en la parte dorsal media del cuello

Aves: 0,25 ml/kg p.v, equivalente a 50mg de oxitetraciclina/kg p.v

Cerdos, Ovinos y Caprinos: 5 a 10 ml/animal adulto; y a 1 a 5 ml/animal joven

Bovinos: 30 a 40 ml/animal adulto; y 10 a 15 ml ternero.

En general, administrar 1 ml/10 kg p.v. En caso necesario y según criterio facultativo, puede repetirse la aplicación a las 48-72 horas.

### Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

### Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos



**Especies:** 

**Presentaciones:**

Frasco de 100ml

Frasco de 250ml

**Tiempo de retiro:**

Carne: 22 días

Leche: 3 días

**Contraindicaciones:**

No administrar a animales con conocida sensibilidad a las tetraciclinas

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I 11.135

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PI33N073376