



LABORATORIOS TOPP, C.A
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y
27 Turmero Estado Aragua.

J-30104680-3

Gerente General

Giuseppe Manilia

Contacto: 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263

giuseppe.manilia@gmail.com

www.laboratoriostopp.com

Ciprocol 10 500 g

Composición

Ciprofloxacina 100,00 g

Colistina 500.00.000 UI

Bromexina 2.50 g

Excipiente, C.S.P. 1000,00 g

Descripción e indicaciones

La Ciprofloxacina es una quinolona de amplio espectro, bactericida, muy usada en medicina humana. Es el principal metabolito en el cual se transforma la Enrofloxacin en el organismo del ave y por tanto es el principal responsable de la actividad de esta quinolona en el organismo de esta especie animal. Su espectro de acción es prácticamente idéntico al de la Enrofloxacin siendo activa contra infecciones causadas por *Mycoplasma* spp, por bacterias Gram (-) como *E. coli*, *Salmonella* spp, *Pasteurella* spp, *Haemophilus* sp, *Klebsiella* sp, y por bacterias Gram (+) como *Clostridium* sp, *Staphylococcus* sp y *Streptococcus* sp, sus características permiten preparar productos en polvo de excelente solubilidad en agua y por tanto sin peligro de producir obstrucciones de cañerías y bebederos.

Colibacilosis, E.R.C. pura o complicada, en infecciones producidas por *Mycoplasma* sp, Coriza Infecciosa, Respiratorias inespecíficas, Salmonelosis, Estafilococias, Estreptococias, Enteritis Necrótica y ulcerativa, Dermatitis Gangrenosa e infecciones secundarias de enfermedades virales.

Vía de Administración y dosificación:

Oral Dosis general:

0.1 a 0.2 g/kg de PV por 3 a 5 días. En infecciones causadas por



Salmonellas sp el tratamiento deberá ser aplicado como mínimo por 5 días.

Dosis práctica: 0.5 - 1.0 g/lit de agua de bebida por 3 a 5 días (0.5 ? 1 Kg/1000 Lts.)

En aves de 3 o más semanas de edad y según sea la gravedad de la infección puede aumentarse la dosis hasta 1.5 a 2.0 g/lit.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Bolsa aluminizadas de 50 g, 100 g, 200 g, 500 g

Tiempo de retiro:

Aves: 7 días

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F. 7.588

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite