



LABORATORIOS TOPP, C.A
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y
27 Turmero Estado Aragua.
J-30104680-3
Gerente General
Giuseppe Manilia
Contacto: 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263
giuseppe.manilia@gmail.com
www.laboratoriostopp.com

Coccitopp

Composición

Sulfaquinoxalina Sodica: 44 g

Primetamina : 12 g

Excipientes C.S.P : 1000 ml

Descripción e indicaciones

La Sulfaquinoxalina es una sulfamida que actúa como antagonista del ácido paraaminobenzoico, suprimiendo la síntesis del ácido tetrahidrofólico esencial para el protozoo. La Pirimetamina es un derivado de la pirimidina, antagonista del ácido fólico, y actúa como inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Ambos compuestos son sinérgicos, su asociación es altamente eficaz profiláctica y terapéuticamente para la Coccidiosis. La proporción de ambos principios activos es de 1:3. Son activos frente a los siguiente coccidios: Eimeria tenella, E. necatrix, E. bruneti, E. acervulina, E. máxima, E. mivati, E. praecox, E. hagani, E. mitis, E. meleagridis, E. adenoides, E. gallopavonis.

Prevención y tratamiento de la Coccidiosis cecal e intestinal en aves y conejos.

Tratamiento del Cólera Aviar y de la Tifosis en las aves.

Vía de Administración y dosificación:

Dosis: 1-1.5 ml x litro de agua durante 3 días seguidos, suspender el tratamiento por 2 días y repetir la misma dosificación por 3 días más.

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Anticoccidial



Especies:



Presentaciones:

Litro

Tiempo de retiro:

Aves, Conejos: 10 días

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F. 5.283

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite