



Representante: AGROSUPLIDORES FL. C.A
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC
MALIA,LOCAL 07

J-31353351-3

GERENTE GENERAL

ALEJANDRO LINARES

Contacto: 0241-8716214

alejandro.linares@agrosuplidores.com.ve

www.agrosuplidores.com.ve



MEGAMIDIUM

Composición

Cada 200 ml contiene:

Clorhidrato de cloruro de Isometamidium 4,0 gramos

Diluyente estéril 200 ml.

Descripción e indicaciones

Isometamidium 4 gramos al 2%

Hemoparasitocida inyectable actúa contra *T. vivax*, *T. congolense*, *T. brucei* y *T. evansi*.

Para el tratamiento específico de la tripanosomiasis en bovinos, ovinos, caprinos y equinos.



Vía de Administración y dosificación:

Vía Intramuscular profunda.

Disolver el contenido del frasco (4gr) en 200 ml de diluyente estéril

TRATAMIENTO DE CONTROL.

1 ml de la solución por cada 40 kg de peso corporal (0,5mg/kg). Esta dosis permite una protección de 2 a 6 meses dependiendo de la actividad y sensibilidad de las cepas de *Tripanosoma*.

En zonas de mediana a alta incidencia aplicar 1 ml de solución por cada 20 kg. de peso corporal (1mg/kg)

TRATAMIENTO CURATIVO

0,5ml de la solución por cada 40 kg de peso corporal (0,25mg/kg)

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Hemoparasitocida

Especies:



Presentaciones:

Frasco con 4 gramos de Isometamidium mas frasco de diluyente esteril de 200ml

Tiempo de retiro:

No administrar el producto dentro de los 30 días antes del sacrificio

Contraindicaciones:

No aplicar via subcutánea

Nro. Registro S.A.S.A.: MF 12.637

Nro. Registro I.N.S.A.I. En Tramite