AGROPECUARIA

AGRIQUIMVET, C.A

AGROPECUARIA AGRIQUIMVET, C.A
Zona Industrial Santa Cruz de Aragua, Av2, Sector D Parcela Nº D8-D9.
J-30298710-5
GERENTE DE VENTAS
JUAN HORACIO COVA
Contacto: 0243-2616654
juanhcovam@gmail.com
www.agriquimvet.com.ve

NORFLOGRIT

Composición

Norfloxacina Base P/V, Agua Desmineralizada CSP, Acido Acético para ajustar PH.

Descripción e indicaciones

La Norfloxacina, posee una buena absorción a través de la vía oral y parenteral. Una vez Administrada por vía oral es absorbida en la mucosa intestinal, lográndose detectar niveles máximos en suero y tejidos después de 1 a 2 horas de su administración, encontrándose en hígado y riñón las más altas concentraciones. Las más bajas concentraciones se encuentran en cerebro y piel.

Vía de Administración y dosificación:

Vía Oral de 2,5 mg por Kg. de peso, la frecuencia cada 24 horas, o a juicio del medico veterinario.

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Envase cilíndrico de plástico de polietileno de alta densidad de color blanco leche con tapa de rosca y liner de aluminio. Altura de 23 cm. Y de diámetro 8.5 cm. Etiqueta autoadhesiva como el modelo anexado. Contenido del envase 1 lt.

Tiempo de retiro:

7 DIAS.

Contraindicaciones:

La inocuidad de las Quinolonas (especialmente la Norfloxacina) se ha establecido en animales de

laboratorios: Terneros, cerdos, perros, gatos y aves de corral, él vomito y diarrea son ocurrencias raras producidas por las fluoroquinolonas. La interacción farmacológica más resaltante es cuando hay tratamiento con comitante con Teofilina, ya que las Quinolonas inhiben la biotransformación de esta dando lugar a concentraciones plasmáticas prolongadas y potencialmente toxicas.

Nro. Registro S.A.S.A.: MF- 10.549 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** EN TRAMITACION