LABORATORIOS PHARMAKUM DE VENEZUELA, C.A.

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com

Florkum 10 %

Composición

Florfenicol??????????.10 mg
Excipientes? c.s.p????.1.000 cm³

Descripción e indicaciones

El FLORFENICOl es un antibiótico sintético de amplio espectro, con un comportamiento bacteriostático frente a la mayoría de las bacterias gram positivas y gram negativas (aerobias y anaerobias), aisladas en aves de corral, desarrollado a partir del Tianfenicol. Su efectividad es más amplia que el Cloranfenicol y es cerca de 100 veces más potente. Ataca bacterias gram positivas y gram negativas, e incluso muestra un espectro superior a su análogo el tianfenicol.El Florfenicol, presenta una gran eficacia contra E. coli, Pasteurella spp. y Haemophilus spp.

Vía de Administración y dosificación:

Aves de corral:
Indicado para tratamiento de enfermedades infecciosas del tracto gastrointestinal, sistema músculo esquelético, respiratorio, reproductivo y nervioso ocasionadas por agentes como: Salmonella spp., Bordetella spp., E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida, Haemophylus gallinarum,Streptococcus spp., Staphylococcus spp., y Clamydia psittaci.
Dosis:
Vía Oral en el agua de bebida. Dosis: 1 cm³ por cada 1.000 cm³ de agua, equivalente a 20 mg por kilogramo de peso vivo, durante 3 a 4 días consecutivos.

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Envases de 1.000 cm³ en empaques de 24 unidades.

Tiempo de retiro:

3 Dias antes del sacrificio

Contraindicaciones:

No administrar en aves ponedoras.

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I. INSAI2041PN33N0

71001