LABORATORIOS PHARMAKUM DE VENEZUELA, C.A.

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com

ENROKUM® 10%

Composición

Cada ml contiene:
Enrofloxacina base?????????..100mg.
Excipientes c.s.p?????????????1m

Descripción e indicaciones

Es Enrofloxacina base, antibio?tico perteneciente al grupo de las quinolonas monofluoradas, de amplio espectro antibio?tico y que posee un singular mecanismo de accio?n. Este actu?a por inhibicio?n enzima?tica de la ADN girasa, necesaria para el ordenamiento correcto de la cadena de ADN bacteria en proceso de transcripcio?n en la si?ntesis proteica.
Se le aplica al rubro avi?cola en el tratamiento y prevencio?n de infecciones del tracto respiratorio causadas por Haemophylus paragallinarum (coriza infecciosa), Micoplasma gallisepticum y synoviae (E.R.C), Pasteurella multocida (co?lera aviar), Pasteurella haemoli?tica, gallinarum, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. Corynebacterium spp., Pseudomona aeruginosa, E. Coli (E.R.C. complicada, infeccio?n de los sacos ae?reos, colisepticemia). Infecciones del tracto gastrointestinal causadas por E. coli (coibacilosis), Salmonella gallinarum, Typhimurium, Enteritidis. Infecciones del aparato genital causadas por Salmonella (pulorosis), E. coli (salpingitis), Micoplasma gallisepticum, y Micoplasma synoviae.

Vía de Administración y dosificación:

BASICA: Aves
Dosis Unica: 10 mg de Enrofloxacina base por Kg de p.v. equivalente a 1 litro de ENROKUM® 10% Oral por cada 1.000 Kg de p.v. por 3 di?as. En casos de salmonelosis, se administra por 5 di?as.
Dosificacio?n Pra?ctica: 1 litro de ENROKUM® 10% Oral por cada 2.000 litros de agua de bebida, por 3 di?as, en casos de Salmonelosis la duracio?n del tratamiento es de 5 di?as.
BASICA: Bovinos (Becerros)

Dosis Unica: 0,5 a 1 ml de ENROKUM® 10% Oral por cada litro de sustituto de la leche.
Avi?cola (Engorde, ponedoras):
Indicaciones:
Enfermedad Respiratoria Cro?nica (E.R.C), Colibacilosis, Pasteurelosis, Micoplasmosis, Coriza infecciosa, Enteritis y Salmonelosis.
Dosis:
1 litro de ENROKUM® 10% Oral por cada 1.000 Kg de p.v. 0,5 ml x litro de agua de bebida.
Dosificacio?n Pra?ctica: 1 litro de ENROKUM® 10% Oral por cada 2.000 litros de agua de bebida, por 3 di?as, en casos de Salmonelosis la duracio?n del tratamiento es de 5 di?as.
Bovino (Becerros):
Indicaciones:
Infecciones: gastrointestinales, respiratorias y genitales.
Dosis:
0,5 a 1 ml de ENROKUM® 10%.
Oral porcadalitrodesustitutode la leche.

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Envases de 1 litro en cajas de 24 unidades c/u

Tiempo de retiro:

No aplica

Contraindicaciones:

No aplica

Nro. Registro S.A.S.A.: SASA.MF. 9.043 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** En trámite