

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com



ANAPOX 200 L.A

Composición

Oxitetraciclina HCL?????????.200 mg
Excipientes c.s.p????????????1 ml

Descripción e indicaciones

La Oxitetraciclina es un agente bacteriostático de amplio espectro, de actividad contra una gran variedad de bacterias Gram-positivas y Gram negativas. Actúa penetrando en el citoplasma a través de la membrana celular, impidiendo la adición de aminoácidos a las cadenas peptídicas, inhibiendo la síntesis proteica de los ribosomas. Esta inhibición de la síntesis proteica reduce notablemente la tasa de desarrollo y multiplicación de los microorganismos.

ANAPOX 200 L.A.®, está indicado en todas las especies.

En Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos. Para el tratamiento de infecciones por gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina: Neumonías, Pasteurelosis, Enteritis Bacteriana, Anaplasmosis, Neumoenteritis, Mastitis, Metritis y Abortos Infecciosos.

Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular profunda en Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos adultos a la dosis de 1 ml/10 kg de p.v. (20mg de Oxitetraciclina / kg p.v.).
En lechones de menos de 10 kg administrar 1ml/lechon, por vía subcutánea.

En Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos para el tratamiento de neumonías, mastitis, metritis, leptospirosis, pasteurelosis, septicemia hemorrágica, aborto enzootico, heridas infectadas, infecciones de ombligo y otras causadas por bacterias sensibles a la oxitetraciclina.

Dosis:



Bovinos: 1 ml/10 Kg pv. vía intravenosa o intramuscular profunda, no aplicar más de 20 ml en el mismo lugar.

Cerdos: 1 ml/10 Kg pv. vía intramuscular profunda, no aplicar más de 10 ml en el mismo lugar. En cerdos menores de 10 Kg de peso se recomienda la vía subcutánea. Ovinos y Caprinos: 1 ml/10 Kg pv. vía intramuscular profunda.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Frascos de 100 ml empaques de 24 unidades.

Frascos de 250 ml empaques de 24 unidades.

Frasco de 500ml empaques de 24 unidades.

Tiempo de retiro:

Animales de carne 28 días. Animales de leche 7 días.

Contraindicaciones:

No aplica

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I.

INSAI2041PN33N0

71017