LABORATORIOS TOPP, C.A
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y 27 Turmero Estado Aragua.
J-30104680-3
Gerente General
Giuseppe Manilia
Contacto: 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263
giuseppe.manilia@gmail.com
www.laboratoriostopp.com

Topptrim

Composición

Tiolosina Tartrato 20 g.

Sulfametoxazol 100 g.

Trimetroprim 20 g.

Colistina 250.000.000 UI

Excipiente, C.S.P. 500 g.

Descripción e indicaciones

La Tilosina es un antibiótico bacteriostático a baja concentraciones y es bactericida a niveles mayores. Su mecanismo de acción es mediante el bloqueo de la síntesis proteíca al impedir la unión de loas ácidos aminoacil-T y peptidil-T ribonucleico a los ribosomas.

La Colistina es un antibiótico eficaz frente a bacterias Gram negativas como: Escherichia coli, Salmonella sp, Enterobacter sp, y Pseudomona aeruginosa. Después de la administración oral, la Colistina prácticamente no se absorbe, quedando su efecto limitado al tracto digestivo. Su mecanismo de acción es atacando la membrana de la célula bacteriana, ejerciendo una rápida acción bactericida. Produce desorganización de la membrana con la consiguiente alteración de la permeabilidad y la salida de los constituyentes celulares, particularmente purinas y pirimidinas. También puede ocurrir la lisis de ciertas células bacterianas.

La asociación de Sulfametoxazol y Trimetoprim posee efecto de sinergia y normalmente bactericida contra varias bacterias Gram (+) y Gram (-) tales como E. coli, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Estafilococo y Estreptococo spp. Los dos compuestos afectan la síntesis de purina bacteriana de manera diferente, lo que resulta en una doble protección. La Colistina es un antibiótico perteneciente al grupo de polimixinas con efecto

bactericida contra bacterias Gram (-) tales como E. coli, Haemophilus y Salmonella.

Aves: Prevención y tratamiento de las afecciones causadas por Mycoplasma spp (ERC complicada), Colibacilosis, Salmonelosis, Coriza Infecciosa y respiratorias inespecíficas de las aves.

Vía de Administración y dosificación:

Oral
Tratamiento preventivo: 0.5 g x litro de agua de bebida por 3 días.

Tratamiento curativo: 0.5 a 1 g/Lt de agua de bebida por 3 a 5 días.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Bolsas aluminizadas de 200 g y 500 g

Tiempo de retiro:

5 dias

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F. 5.293

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite