



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

ECTO-VEEX

Composición

Amitraz ??????????????.12,5 g
Cipermetrina ????????.???. 2,5 g
Excipientes c.s.p????????? 100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos, ovinos y porcinos.

ECTO-VEEX es un garrapaticida indicado para Bovinos y ovinos:
Tratamiento y control de infestaciones por garrapatas (*Boophilus microplus*, *Amblyomma cajennense*), moscas (*Haematobia irritans*, *Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea irritans*), ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis*, *Chorioptes bovis*) y piojos (*Linognathus* sp., *Haematopinus* sp., *Damalinia bovis*).

Porcinos: Tratamiento y control de infestaciones por ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*), piojos (*Haematopinus suis*) y moscas.

Vía de Administración y dosificación:

Baño por aspersión o baño por inmersión: para Bovinos: diluir 1 litro de ECTO-VEEX en 700 l de agua. En cuanto a Ovinos y porcinos: diluir 1 litro de ECTO-VEEX en 350 l de agua. Hacer una predilución depositando la dosis a aplicar en un litro de agua y luego agregarla al resto del agua, agregar la mezcla a la máquina aspersora y rociar los animales contra el pelo, utilizando 5 litros de solución por bovino adulto, asegurándose que todo el pelo quede mojado.

La frecuencia de baños depende del tipo de garrapata. Para *Boophilus microplus* se recomienda baños cada 21 días y para *Amblyomma cajennense* cada 7 días.

Forma farmacéutica:

Solución Tópica (Baño)



Efecto terapéutico:

Ectoparasiticida

Especies:**Presentaciones:**

1 L y 286 mL

Tiempo de retiro:

Carne 7 días.

Leche 24 horas.

Contraindicaciones:

No aplicar en Equinos.

Nro. Registro S.A.S.A.: P.F 4.828

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite