



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.  
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A  
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca  
J-07524745-0

**Asistente Gerencia Ventas**  
Amarilis Espinoza  
**Contacto:** 0243-5515432 5516403  
ventas@reveex.com  
www.reveex.com

## FENIVEEX SOLUCION INYECTABLE

### Composición

Florfenicol.....???????.. 30 g  
Excipiente c.s.p. ?????..... 100 ml

### Descripción e indicaciones

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Tratamiento curativo de infecciones del tracto respiratorio causadas por Pasteurella haemolytica, P. multocida (Pasteurelisis ? Fiebre del embarque) e infecciones respiratorias.

Tratamiento curativo de la Pododermatitis infecciosa bovina causada por Fusobacterium y Bacteroides melaninogenicus.

Porcinos: Tratamiento curativo del complejo Neumónico causado por Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, P. haemolytica y Haemophilus sp.

### Vía de Administración y dosificación:

Vía IM. La inyección debe hacerse sólo en la musculatura del cuello. No administrar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.

Bovino: administrar 20 mg de florfenicol/kg p.v. /día (equivalente a 6,6 ml de FENIVEEX INYECTABLE/100 Kg p.v. /día), durante dos días consecutivos (48 horas). Se recomienda utilizar una aguja con 1,6 mm de diámetro.

Otras especies: administrar 3 ml/100 kg. p.v.

Una vez abierto el envase tiene una validez de 28 días.



### Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

### Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

**Especies:**    

**Presentaciones:**

100 mL

**Tiempo de retiro:**

Carne: 18 días. El tiempo de espera se calcula desde la última administración del fármaco. Debe apuntarse que para cualquier tiempo de espera, no puede darse a humanos ningún alimento de origen animal durante el periodo de tratamiento.

Leche: no usar.

**Contraindicaciones:**

No administrar en animales de leche cuya leche pueda ser utilizada para el consumo humano. No administrar en machos adultos utilizados con fines reproductivos. No administrar en casos de reacciones alérgicas previas a florfenicol.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** N/A

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PN33N072044