



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

GENTAVEEX 12%

Composición

Gentamicina (sulfato) 12 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

Descripción e indicaciones

Porcinos: Colibacilosis, Salmonelosis, Septicemia hemorrágica.

Bovinos: Colibacilosis, Salmonelosis, Mastitis, Pasteurelisis,
Bronconeumonía, Infecciones genitourinarias.

Equinos: Colibacilosis, Salmonelosis, Bronconeumonía, Metritis.

Perros: Infecciones urinarias, Neumonía, Rinitis, Infecciones cutáneas,
Artritis infecciosa.



Vía de Administración y dosificación:

Intramuscular.

Porcinos, Bovinos y Equinos: 1 ml/40 kg p.v (3 mg de Gentamicina/kg p.v),
cada 12 horas durante 3 días.

Perros: 0,2 ml/8 kg p.v. (3 mg de Gentamicina/kg p.v), cada 12 horas,
durante 4 a 5 días.

Administración de dosis pequeñas, así como por vía intravenosa lenta en
grandes animales, puede efectuarse aplicando el producto diluido al 5% en
suero glucósado estéril.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

100 mL

Tiempo de retiro:

Carne:

Porcinos: 40 días.

Bovinos y Equinos: 60 días.

Leche: 3 días.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la gentamicina.

No administrar en hembras gestantes.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F 12.151

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite