LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

IVERMECTINA 1%

Composición

Ivermectina ?????????????????? 1 g
Excipiente c.s.p. ?.....??.....?????????? 100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos: Hipodermosis, Nematodosis gastrointestinal.
Nematodosis pulmonar, Parasitosis externas, Sarna.
Ovinos y caprinos: Estrosis, Nematodosis gastrointestinal, Nematodosis pulmonar y Parasitosis externas, Sarna
Porcinos: Nematodosis gastrointestinal, Nematodosis pulmonar, Parasitosis externas, Sarna.
Prevención de la Dirofilariosis cardiopulmonar canina (enfermedad del gusano del corazón), eliminando el estado larvario tisular de Dirofilaria inmitis.
Tratamiento y control de la sarna de las orejas (Otodectes cynotis) e infestaciones por piojos.

Vía de Administración y dosificación:

Vía subcutánea.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: 0.20 mg/ kg p.v. vía subcutánea en dosis única (equivalente a 0,2 mL/ 10 Kg p.v.) vía subcutánea en dosis única.
Porcino: 0,30 mg/ kg p.v. vía subcutánea en dosis única (equivalente a 0,3 mL / 10 Kg p.v.) vía subcutánea en dosis única.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antiparasitario Endectocida

Especies:

Presentaciones:

100 mL y 500 mL

Tiempo de retiro:

CARNE: Bovinos y porcinos: 28 días.
Ovinos y caprinos: 21 días.

Contraindicaciones:

En algunos casos pueden presentarse signos clínicos de dolor y/o reacción inflamatoria en el punto de inyección.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N071900