LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

ANTIDIAREX

Composición

Atapulgita activada???????????7 g
Neomicina (sulfato)?????????..0,5 g
Sulfaguanidina (sódica)???????..1,2 g
Tetraciclina (clorhidrato)??????..0,2 g
Tylosina (tartrato)???????????0,2 g
Vitamina B1????????????..150 mg
Vitamina B2????????????..150 mg
Vitamina B6????????????..150 mg
Vitamina C?????????????????0,5 g
Vitamina A???????????.200.000 UI
Excipiente c.s.p???????????100 ml

Descripción e indicaciones

Bovinos, Ovinos, Caprinos y porcinos: Prevención y tratamiento de diarreas, colibacilares y salmonelosis.
Perros y gatos: Tratamiento de enteritis bacterianas, enteritis de origen tóxico o alimentario, diarreas hemorrágicas asociadas con la leptospirosis, diarreas por moquillo, diarreas asociadas a infestaciones parasitarias.

Vía de Administración y dosificación:

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos.
Agitar el envase y administrar por vía oral directa.
Lechones, corderos y cabritos hasta 5 semanas de edad:
2 a 4 ml / animal, cada 12 horas.
Terneros: 15 a 20 mL / ternero, cada 12 horas. Tratar durante 3 a 5 días.
Perros y Gatos: 1 mL/Kg. p.v. cada 12 horas, durante 3 a 5 días seguidos
En casos graves, administrar el doble de la dosis indicada, por lo menos el primer día de tratamiento.

Forma farmacéutica:

Suspensión Oral

Efecto terapéutico:

Anti diarreico,Antibióticos/Antimicrobianos,Suplemento nutricional vitamínico

Especies:

Presentaciones:

50 mL, 200 mL

Tiempo de retiro:

Carne: 30 días.
Leche: 5 días.

Contraindicaciones:

No administrar a animales deshidratados, con insuficiencia renal, hepática o con depresión respiratoria.
No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la especialidad.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N072307