



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.  
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A  
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca  
J-07524745-0

**Asistente Gerencia Ventas**

Amarilis Espinoza

**Contacto:** 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

## SEPTIBRON FORTE

### Composición

Florfenicol?????????????????..15g  
Lincomicina base?????????????5,7 g  
Dipirona?????????????????...2,8 g  
Dexametasona?????????????7 mg  
Guayacolglicerileter?????????.?3 g  
Prometazina HCL?????????.?0,15 g  
Lidocaina base?????????????.0,4 g  
Excipientes c.s.p. ??????????.100 mL



### Descripción e indicaciones

Tratamiento y control de infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la Florfenicol y Lincomicina, en particular:

Porcinos: En cerdos para prevenir y tratar la neumonía enzootica, (Mycoplasma hyopneumoniae), Enteritis Proliferativa, Porcina (Ileitis) y Disentería Porcina.

Bovinos, Ovinos y Caprinos: Tratamiento de enfermedades respiratorias, incluyendo la enfermedad respiratoria bovina (ERB) de frecuente aparición en animales en confinamiento debidas a Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus y Corynebacterium pyógenes. Diarrea de terneros. Queratoconjuntivitis. Pododermatitis causada por Fusobacterium necrophorum y Bacteroides melaninogenicus Infecciones del tracto genital, endometritis. Infecciones en general.

### Vía de Administración y dosificación:

Porcinos, Ovinos, Bovinos y Caprinos.

Tratamiento curativo:

Vía IM: 20 mg/kg de peso vivo (1 mL/15 kg) administrado dos veces con un intervalo de 48 horas utilizando una aguja de calibre 16.

Vía SC: 40 mg/kg de peso vivo (2 mL/15 kg) administrado en una única dosis utilizando una aguja de calibre 16.

Tratamiento Preventivo:

Vía SC: 40 mg/kg de peso vivo (2 mL/15 kg) administrado en una única dosis utilizando una aguja calibre 16. El volumen administrado por punto de inyección no debe exceder 10 ml.

La inyección debería darse sólo en el cuello.

Para garantizar la dosis correcta se debe determinar el peso del animal previamente para evitar la infradosificación.

### **Forma farmacéutica:**

Solución Inyectable

### **Efecto terapéutico:**

Analgésico, Antiinflamatorio, Antibióticos/Antimicrobianos, Antipiréticos

### **Especies:**



### **Presentaciones:**

20 mL, 100 mL

### **Tiempo de retiro:**

Carne: 30 días.

Leche: su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.

### **Contraindicaciones:**

No usar en toros adultos utilizados con fines reproductivos.

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

No usar en caso de resistencia a la sustancia activa.

En caballos, ni animales que padezcan infecciones preexistentes por Monilia sp.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** N/A

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PN33N072928