



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

CIPROVEX

Composición

Ciprofloxacina (clorhidrato)..... 10 g
Colistina (sulfato)?.....50.000.000 U.I
Excipiente c.s.p.....100 g

Descripción e indicaciones

Aves: (Pollos de engorde, Reproductoras y Pollitas de reemplazo).
Colibacilosis, Enfermedad Respiratoria Crónica (C.R.D) pura o complicada
con E. coli, Salmonelosis, Micoplasmosis, Coriza infecciosa, Pasteurellosis,
Estafilococia, Estreptococia, Infecciones bacterianas secundarias
asociadas a procesos víricos.

Vía de Administración y dosificación:

Administrar por vía oral, en agua de bebida.

Pollos de engorde de menos de 3 semanas, Reproductoras pesadas de
menos de 3 semanas, Reproductoras ligeras de menos de 5 semanas y
pollitas de reemplazo de menos de 5 semanas: 0,5 g / litro agua de bebida
/ día, durante 3 a 5 días.

Pollos de engorde de más de 3 semanas, Reproductoras pesadas de más
de 3 semanas, Reproductoras ligeras de más de 5 semanas y Pollitas de
reemplazo de más de 5 semanas: 1 g / litro agua de bebida / día, durante 3
a 5 días.

En caso de Salmonelosis, Infecciones mixtas o Procesos crónicos, tratar
durante 5 días como mínimo.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

1 Kilo

Tiempo de retiro:

CARNE: 9 días.

HUEVOS: No usar.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con insuficiencia renal o hepática ni a aquellos que hayan demostrado sensibilidad a los componentes.

No debe ser administrado a animales recién nacidos.

No administrar en aquellos casos en que haya una infección estreptocócica previa, ya que puede existir una sensibilidad marginal de los estreptococos a la ciprofloxacina.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N072927