

BROMHEXOL POLVO SOLUBLE

Composición

Cada 100 g de BROMHEXOL contienen:

PRINCIPIO ACTIVO

Bromhexina Clorhidrato 1.0 g

EXCIPIENTES c.s.p 100 g

Descripción e indicaciones

Broncosecretolítico y expectorante en bovinos, equinos, porcinos, perros, gatos, pollos de engorde y aves de reemplazo.

Vía de Administración y dosificación:

Administración por vía oral en el agua de bebida o mezclado en el alimento.

Para una completa disolución de Bromhexol® en el agua es necesario acidificarla previamente. Para tal fin cada caja del producto contiene un sobre de ácido cítrico en relación de 5:1.

1. De acuerdo con el número a tratar y su consumo diario de agua, calcule la dosis de producto a utilizar partiendo de 0.1 g de Bromhexol® por ave.
2. Disolver en un balde con agua la cantidad de ácido cítrico, proporcional a la cantidad de Bromhexol® que va a diluir (No. De aves*0.1= gramo de Bromhexol® por tratamiento). (gramos de Bromhexol®/5= g de ácido cítrico necesarios para adicionar al agua de bebida).
3. En el agua previamente acidificada adicionar la cantidad de Bromhexol® necesaria de la medicación y mezclar bien.
4. Agregar y agitar ésta solución en el tanque de agua de consumo cada día.

Dosis por especies:

Aves de corral: 0.1 g / ave / día.

Cerdos adultos: 5 g / animal / día.

Lechones: 1 g / animal / día.

Bovinos y Equinos adultos 10 - 15 g / animal / día.



Becerras y Potros: 3 ? 7 g / animal / día.
Perros y Gatos: 0.25-2 g / animal / día.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Expectorante

Especies:



Presentaciones:

Sobre Foil de 500 g y 1 kg

Tiempo de retiro:

No posee tiempo de retiro.

Contraindicaciones:

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico Veterinario.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I.: 9.971

Nro. Registro I.N.S.A.I. En Trámite