Representante: AGROSUPLIDORES FL. C.A
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC
MALIA,LOCAL 07
J-31353351-3
GERENTE GENERAL
ALEJANDRO LINARES
Contacto: 0241-8716214
alejandro.linares@agrosuplidores.com.ve
www.agrosuplidores.com.ve

OXIPRA-20 L.A.

Composición

Cada ml contiene:
Oxitetraciclina (clohidrato) 200mg
Excipientes c.s.p

Descripción e indicaciones

Debido a sus caracterìsticas farmacocinèticas particulares,una sola administraciòn intramuscular es suficiente para mantener los niveles terapèuticos del antibiòtico en sangre durante 3 a 5 dìas. Los niveles màximos en sangre se obtienen ràpidamente, lo que le hace apropiado para el tratamiento de las infeciones agudas.
Aves:Pasteurelosis,CRD y Coriza infeccioso
Cerdos: Septicemia Hemorràgica,Diarreas, Enteritisbacterianas y Sìndrome MMA
Ovinos y Caprinos: Clamidiosis,Pasteurelosis,Diarreas y Enteritis bacterianas.
Bovinos:Neumoenteritis,Mastitis y Metritis

Vía de Administración y dosificación:

Intramuscular Profunda
En aves,vìa subcutànea, en la parte dorsal media del cuello
Aves:0,25 ml/kg p.v,equivalente a 50mg de oxitetraciclina/kg p.v
Cerdos,Ovinos y Caprinos: 5 a 10 ml/animaladulto; y a 1 a 5 ml/animal joven
Bovinos:30 a 40 ml/animal adulto; y 10 a 15 ml ternero.
En general,administrar 1 ml/10 kg p.v. En caso necesario y segun criterio facultativo,puede repetirse la aplicaciòn a las 48-72 horas.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Frasco de 100ml
Frasco de 250ml

Tiempo de retiro:

Carne:22 dìas
Leche: 3 dìas

Contraindicaciones:

No administrar a animales con conocida sensibilidad a las tetraciclinas

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I 11.135 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PI33N073376