

Representante: LABORATORIOS QUIMIO-VET C.,
Av Principal paralela a la Autopista Regional del
Centro, Galpon N0 5 Ueb Industrial La Union,
J30591179-1

Gerente de Mercadeo y Nuevos Negocios.

Felix Francisco Santana Merrick

Contacto: 0241-8728736

felix.santana@quimiovet.com.ve

www.quimiovet.com.ve

Doloalivio

Composición

Principio activo: ETODOLAC (150mg.) Formación de prostaglandinas con actividad inflamatoria y mediadoras del dolor Formación de prostaglandinas que regulan funcionamiento de células. Acción protectora a nivel gasto intestinal y renal.

Descripción e indicaciones

Potente antiinflamatorio no esteroide (AINE), con acción analgésica y antipirética, de rápido inicio (pico máximo en sangre a las dos horas de administrado vía oral) y buena persistencia. Indicado para el tratamiento del dolor y la inflamación de diversos orígenes, especialmente efectivo en: Osteoartritis, osteoartritis secundaria por displasia de cadera, artritis reumatoidea, tratamiento pre y post quirúrgico, coadyuvante en la reducción del edema de los tejidos.

Vía de Administración y dosificación:

comprimido cada 10 a 15 Kg de peso, administrado cada 24 horas, vía oral. La dosis debe ser ajustada hasta obtener una respuesta clínica satisfactoria, pero nunca superar la máxima de 15 mg/kg por día. La duración del tratamiento será de ocho días. Puede administrarse con las comidas o alejadas de ellas. En el caso de administrarse con el alimento, la dosis total se mezclará en una pequeña cantidad del mismo, para asegurarse su consumo total.

Forma farmacéutica:

Comprimido Oral

Efecto terapéutico:

Antiinflamatorio no esteroideo AINES

Especies: 



Presentaciones:

Envase conteniendo 15 comprimidos palatables birranurados.

Tiempo de retiro:

NO APLICA

Contraindicaciones:

No utilizar en felinos. No utilizar en caninos con hipersensibilidad al etodolac. No se recomienda su uso en hembras preñadas o en lactación. Está contraindicado su uso con otros AINE o corticoides. No utilizar en caninos con antecedentes de úlcera gástrica. No utilizar en pacientes que presenten síntomas de deshidratación.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I.12.784

Nro. Registro I.N.S.A.I. INSAI2041PI33N07