Representante: LABORATORIOS QUIMIO-VET C.A
Av Principal paralela a la Autopista Regional del Centro,Galpon N0 5 Ueb Industrial La Union, J30591179-1
Gerente de Mercadeo y Nuevos Negocios.
Felix Francisco Santana Merrick
Contacto: 0241-8728736
felix.santana@quimiovet.com.ve
www.quimiovet.com.ve

Kil Amitraz

Composición

Principio activo: AMITRAZ (como Amitraz 100 %) (12,5 g) Garrapaticida y antisárnico para caninos.

Descripción e indicaciones

Kil Amitraz es un antiparasitario externo, garrapaticida y antisárnico para caninos. Su uso permite controlar los siguientes parásitos: Riphicephallus sanguineus (garrapata común del canino) Sarcoptes scabiei (sarna) Demodex canis (sarna demodectica) Notoedres cati (sarna notoédrica).

Vía de Administración y dosificación:

KIL Amitraz es un producto de uso externo. Puede aplicarse por medio de baños de aspersión, baños de inmersión y por aplicación tópica en lesiones localizadas Las soluciones para baños deben prepararse de acuerdo al siguiente esquema: * Garrapata 2 mL: 1 litro de agua (250 ppm) * Sarna demodéctica o sarcóptica: 4 mL: 1 litro de agua (500 ppm) La emulsión resultante debe aplicarse sobre el perro limpio y seco. Debe aplicarse cubriendo de forma abundante la superficie corporal afectada. Cuando se utiliza como enjuague después del baño, es importante secar bien el animal antes de aplicar el producto. En el tratamiento de sarna (sarcóptica, demodéctica o notoédrica): aplicar semanalmente hasta treinta días después de remitidos completamente los síntomas. Algunos casos de demodexia, requieren tratamientos de refuerzo cada 2 a 8 semanas durante períodos prolongados, hasta de por vida. La duración del tratamiento siempre debe quedar a criterio del Veterinario actuante. Las emulsiones del producto en agua deben usarse inmediatamente después de su preparación. Descartar cualquier sobrante.

Forma farmacéutica:

Solución Tópica (Baño)

Efecto terapéutico:

Insecticida

Especies:

Presentaciones:

Envase plástico conteniendo 20 mL

Tiempo de retiro:

NO APLICA

Contraindicaciones:

No administrar a hembras preñadas o en lactación. No administrar a cachorros menores a 45 días. No administrar a animales diabéticos. No administrar a gatos.

Nro. Registro S.A.S.A.: P.I.12.787 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** NO APLICA