Representante: ILENDER VENEZUELA, C.A.
Avenida Cedeño Torre Empresarial Nivel Mezzanina O
C-10, Valencia ?Estado Carabobo
J-30124963-1
Gerente de Operaciones
Jaimalida Cardozo
Contacto: 0241-8570368
jcardozo@ilendercorp.com
www.ilendercorp.com

FOSBAC PLUS T

Composición

Fosfomicina Cálcica ..... 20 g
Tilosina Tartrato ..... 5 g
Fructosa 1,6 difosfato ..... 18 g
Exipientes c.s.p. ..... 100 g

Descripción e indicaciones

Polvo homogéneo de color blanco que fluye con facilidad.
Fosbac? Plus T es apropiado para usar en Gallináceas; Pollos de engorde; Recrías livianas y pesadas, en el tratamiento de: Micoplasmosis, Colibacilosis, Enfermedad respiratoria crónica, Coriza; Tifosis; Cólera Aviar; Listeriosis; Infecciones estafilococicas y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la Fosfomicina y/o Tilosina.

Vía de Administración y dosificación:

Administrar por vía oral; mezclado en el agua de bebida o alimento. La dosis recomendada es 160 mg de Fosbac? Plus T por kilo de peso vivo durante 3 a 7 días, según el criterio del médico veterinario actuante.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Fosbac? Plus T se comercializa en la siguiente presentación:
Balde 5 Kg. - Balde de PEAD conteniendo 5 sobres trilaminados de 1 Kg.

Tiempo de retiro:

Suspender el tratamiento 7 días antes de la faena. Utilizar dentro de los 30 días de preparada la mezcla

con el alimento.

Contraindicaciones:

No administrar a ponedoras en producción de huevos destinados al consumo humano.

Nro. Registro S.A.S.A.: 7.548 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** EN TRÁMITE