

AGROPECUARIA
AGRIQUIMVET, C.A

AGROPECUARIA AGRIQUIMVET, C.A
Zona Industrial Santa Cruz de Aragua, Av2, Sector D Parcela
Nº D8-D9.
J-30298710-5
GERENTE DE VENTAS
JUAN HORACIO COVA
Contacto: 0243-2616654
juanhcovam@gmail.com
www.agriquimvet.com.ve

NORFLOGRIT

Composición

Norfloxacin Base P/V, Agua Desmineralizada CSP, Acido Acético para
ajustar PH.

Descripción e indicaciones

La Norfloxacin, posee una buena absorción a través de la vía oral y
parenteral. Una vez Administrada por vía oral es absorbida en la mucosa
intestinal, lográndose detectar niveles máximos en suero y tejidos después
de 1 a 2 horas de su administración, encontrándose en hígado y riñón las
más altas concentraciones. Las más bajas concentraciones se encuentran
en cerebro y piel.

Vía de Administración y dosificación:

Vía Oral de 2,5 mg por Kg. de peso, la frecuencia cada 24 horas, o a juicio
del medico veterinario.

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Envase cilíndrico de plástico de polietileno de alta densidad de color blanco leche con tapa de rosca y liner
de aluminio. Altura de 23 cm. Y de diámetro 8.5 cm. Etiqueta autoadhesiva como el modelo anexo.
Contenido del envase 1 lt.

Tiempo de retiro:

7 DIAS.

Contraindicaciones:

La inocuidad de las Quinolonas (especialmente la Norfloxacin) se ha establecido en animales de

laboratorios: Terneros, cerdos, perros, gatos y aves de corral, el vomito y diarrea son ocurrencias raras producidas por las fluoroquinolonas. La interacción farmacológica más resaltante es cuando hay tratamiento con comitante con Teofilina, ya que las Quinolonas inhiben la biotransformación de esta dando lugar a concentraciones plasmáticas prolongadas y potencialmente toxicas.

Nro. Registro S.A.S.A.: MF- 10.549

Nro. Registro I.N.S.A.I. EN TRAMITACION