

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com



ENROKUM® 10%

Composición

Cada ml contiene:

Enrofloxacin base.....100mg.

Excipientes c.s.p.....1m

Descripción e indicaciones

Es Enrofloxacin base, antibiótico perteneciente al grupo de las quinolonas monofluoradas, de amplio espectro antibiótico y que posee un singular mecanismo de acción. Este actúa por inhibición enzimática de la ADN girasa, necesaria para el ordenamiento correcto de la cadena de ADN bacteria en proceso de transcripción en la síntesis proteica. Se le aplica al rubro avícola en el tratamiento y prevención de infecciones del tracto respiratorio causadas por Haemophilus paragallinarum (coriza infecciosa), Mycoplasma gallisepticum y synoviae (E.R.C), Pasteurella multocida (cólera aviar), Pasteurella haemolytica, gallinarum, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. Corynebacterium spp., Pseudomonas aeruginosa, E. Coli (E.R.C. complicada, infección de los sacos aéreos, colisepticemia). Infecciones del tracto gastrointestinal causadas por E. coli (colibacilosis), Salmonella gallinarum, Typhimurium, Enteritidis. Infecciones del aparato genital causadas por Salmonella (pulorosis), E. coli (salpingitis), Mycoplasma gallisepticum, y Mycoplasma synoviae.

Vía de Administración y dosificación:

BASICA: Aves

Dosis Unica: 10 mg de Enrofloxacin base por Kg de p.v. equivalente a 1 litro de ENROKUM® 10% Oral por cada 1.000 Kg de p.v. por 3 días. En casos de salmonelosis, se administra por 5 días.

Dosificación Práctica: 1 litro de ENROKUM® 10% Oral por cada 2.000 litros de agua de bebida, por 3 días, en casos de Salmonelosis la duración del tratamiento es de 5 días.

BASICA: Bovinos (Becerras)



Dosis Unica: 0,5 a 1 ml de ENROKUM® 10% Oral por cada litro de sustituto de la leche.

Avi?cola (Engorde, ponedoras):

Indicaciones:

Enfermedad Respiratoria Cro?nica (E.R.C), Colibacilosis, Pasteurelisis, Micoplasmosis, Coriza infecciosa, Enteritis y Salmonelosis.

Dosis:

1 litro de ENROKUM® 10% Oral por cada 1.000 Kg de p.v. 0,5 ml x litro de agua de bebida.

Dosificacio?n Pra?ctica: 1 litro de ENROKUM® 10% Oral por cada 2.000 litros de agua de bebida, por 3 di?as, en casos de Salmonelosis la duracio?n del tratamiento es de 5 di?as.

Bovino (Becerras):

Indicaciones:

Infecciones: gastrointestinales, respiratorias y genitales.

Dosis:

0,5 a 1 ml de ENROKUM® 10%.

Oral por cada litro de sustituto de la leche.

Forma farmac?utica:

Soluci?n Oral

Efecto terap?utico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Envases de 1 litro en cajas de 24 unidades c/u

Tiempo de retiro:

No aplica

Contraindicaciones:

No aplica

Nro. Registro S.A.S.A.: SASA.MF. 9.043

Nro. Registro I.N.S.A.I. En trámite