

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com



FLORKUM 30

Composición

Florfenicol?????????.300 mg.
Excipientes c.s.p?????????1 ml.

Descripción e indicaciones

FLORKUM® 30 Inyectable, es Florfenicol, antibiótico de nueva generación con características farmacológicas únicas. Perteneciente al grupo de los Teco y proviene de la manipulación sintética del Cloramfenicol y el Tiamphenicol. Su margen de seguridad en cuanto a residuos en carne y leche es del 100%, y su efectividad es insuperable.

FLORKUM® 30 Inyectable, está indicado en casos de afecciones del aparato respiratorio (Neumonías, bronquitis), del aparato locomotor (Pododermatitis, Artritis), del aparato reproductivo (Metritis), del tracto gastrointestinal (Gastroenteritis, Clostridiosis) y en Mastitis en bovinos, síndrome m.m.a (Mastitis, Metritis, Agalaxia), Septicemias, y en general, en todo proceso infeccioso causado por Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Staphylococcus spp., Bacteroides spp., Clostridium spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Treponema spp., Corinebacterium.

Vía de Administración y dosificación:

BÁSICA:

Bovinos Y Porcinos: 20 mg por cada Kg de p.v. equivalente a 1 ml de FLORKUM® 30 Inyectable por cada 15 Kg de p.v. en dos dosis con intervalo de 48 horas como tratamiento total.

Bovino:

Indicaciones:

Afecciones del:

Aparato respiratorio (Neumonías y Bronquitis) Aparato locomotor: (Pododermatitis y Artritis), Aparato reproductivo (Metritis y Mastitis), Tracto gastrointestinal (Gastroenteritis y Clostridiosis). Septicemias.



Dosis:

20 mg/Kg p.v. equivalente a 1 ml de FLORKUM® 30 Inyectable por cada 15 Kg de p.v. vía intramuscular en dos tratamientos a intervalo de 48 horas.

Porcino:

Indicaciones:

Afecciones del:

Aparato respiratorio (Neumonías, Bronquitis y Actinobacilosis). Aparato locomotor (Pododermatitis y Artritis), Aparato reproductivo (Mastitis, Metritis y Agalaxia), Tracto gastrointestinal (Gastroenteritis y Clostridiosis). Septicemias.

Dosis:

20 mg/Kg p.v. equivalente a 1 ml FLORKUM® 30 Inyectable por cada 15 Kg de p.v. vía intramuscular en dos tratamientos a intervalo de 48 horas.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Fascos inyectables color ámbar sellados al vacío presentación de 10 ml (empaques de 25 unidades).
Fascos de 100 ml empaques de 24 unidades.

Tiempo de retiro:

28 Dias

Contraindicaciones:

No administrar en hembras en lactación cuya leche sea para consumo humano.

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I. INSAI2041PN33N0