

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com



Tilvix200

Composición

Cada ml contiene:
Tilosina Tartrato (equiv. Base) ? . 200 mg.

Descripción e indicaciones

Macro?lido de amplio espectro de accio?n para el tratamiento y
prevencio?n de infecciones primarias y complicadas.

Propiedades:

Accio?n bacteriosta?tica contra una gran variedad de ge?rmenes.
Excelente actividad sobre ge?rmenes Gram positivos y Micoplasmas.
Es el antibio?tico de eleccio?n contra el treponema hyodisenteriae y
Micoplasmosis en cerdos.

Tilvix200, esta? indicado para:

En Porcinos: Neumoni?as causadas por Pasteurella Multocida y
Actinomicces Pyogenes, artritis e infecciones secundarias a infecciones
virales y heridas infectadas.

En Bovinos: Neumoni?as asociadas, septicemia hemorra?gica,
pododermatitis necro?tica, mastitis causadas por Streptococcus y
Staphylococcus, neumoenteritis de los terneros, infecciones bacterianas
secundarias a infecciones virales y heridas infectadas.

Vía de Administración y dosificación:

Vi?a intramuscular a la dosis de 10 mg / Kg/ p.v., equivalente a 1 ml/20
Kg/p.v., cada 24 horas, de 3 a 5 di?as, continuando por 24 horas mas,
luego de la desaparicio?n de los si?ntomas. No aplicar mas de 10 ml. en el
mismo lugar, en el caso de bovino y cerdos no aplicar ma?s de 5 ml en el
mismo lugar.



Porcinos:

Indicaciones:

Neumonías causadas por *Pasteurella Multocida* y *Actinomyces Pyogenes*.
Artritis e infecciones secundarias a infecciones virales. Heridas infectadas.

Dosis:

Aplicación parental: Vía intramuscular: 10 mg / Kg/ p.v., equivalente a 1 ml/20 Kg/p.v.

Bovinos:

Neumonías asociadas, septicemia hemorrágica, pododermatitis necrótica, mastitis causadas por *Streptococcus* y *Staphylococcus*,
neumoenteritis de los terneros, infecciones bacterianas secundarias a infecciones virales y heridas infectadas.

Dosis:

Cada 24 horas de 3 a 5 días, continuando por 24 horas más, luego de la desaparición de los síntomas.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:  

Presentaciones:

Fascos de 100 cc en empaque de 24 unidades

Tiempo de retiro:

Carne: 8 días y Leche: 96 hora

Contraindicaciones:

No aplicar más de 10 ml. en el mismo lugar, en el caso de bovino y cerdos no aplicar más de 5 ml en el mismo lugar.

Nro. Registro S.A.S.A.: SASA. MF. 10.525

Nro. Registro I.N.S.A.I. En trámite