LABORATORIOS PHARMAKUM DE VENEZUELA, C.A.

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com

Leptok 50

Composición

Dihidroestreptomicina (base como sulfato).....500mg
Excipientes c.s.p.....1ml

Descripción e indicaciones

Indicado en bovinos y procinos para el tratamiento de las enfermedades causadas por gérmenes sensibles al componente, como son: Leptospirosis, aborto vibrionico, septicemias y algunas patologias puerperales.

Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular profunda.
La dosis general recomendada es de 2,5 a 5 ml/100kg/pv. En casos de Leptospirosis la dosis recomendada es de 10ml/100kg/pv en un solo tratamiento o en tres tratamientos interdiarios de 5ml/100kg/pv. No aplicar mas de 20 ml en un mismo lugar.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Inyectables de 100 ml.

Tiempo de retiro:

72 horas para leche y 30 días para carne.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con antecedentes de alergia a la Penicilina, Dihidroestreptomicina o Nafcilina.
No usar en vacas en lactación.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.P.P.A.T. - SASA M.F.: **Nro. Registro I.N.S.A.I.** En trámite