

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.

J-31206749-7

Asesor Técnico

María de los Angeles Rivero Mendoza

Contacto: 0243-2455524

mariarivero_m@yahoo.com



Gentak

Composición

Gentamicina (base).....100mg

Excipientes c.s.p.....1ml

Descripción e indicaciones

Esta indicado en bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos, para el tratamiento de las infecciones del aparato gastrointestinal, respiratorio y genitourinario, causadas por gérmenes sensibles a la Gentamicina.

Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular: 0,5ml/10kg/pv. equivalente a 5mg/kg/pv/día, durante 3 a 5 días

Vía intrauterina: En metritis, endometritis y cervicitis, en vacas: diluir de 2 a 10 ml de GENTAK en 500ml de solución fisiológica, cada 24 horas, durante 3 a 5 días. En yeguas. diluir de 5 a 25 ml de GENTAK en 500ml de solución fisiológica, cada 24 horas, durante 3 a 5 días.

Prevención: Aves: pollitos de 1 día de nacidos, diluir 1ml de GENTAK en 99 ml de diluyente (agua destilada, solución fisiológica o diluyente de vacuna de Marek) y administrar 0,2 ml, por pollito, por vía subcutánea.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Inyectables de 100 ml



Tiempo de retiro:

30 Días para animales de carne

Contraindicaciones:

No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a la Gentamicina

No usar en gestación, no usar en animales con insuficiencia renal, no administrar en ponedoras cuyos huevos se destinen a consumo humano, no mezclar con otros antibióticos.

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I. INSAI2041PN33N0

7935